

## 1 YAŞ ÜSTÜ HİÇ AŞILANMAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN AŞILAMA ŞEMASI

	12-71 ay (1-5 yaş) *	6-13 yaş	14 yaş ve üzeri
İlk Karşılaşma	DaBT-İPA-Hib <sup>1</sup> (5 li Karma), Hep-B , KPA2, ppd ile TCT	DaBT-İPA, Hep-B, KKK	Td+OPA veya (daBT-IPV), Hep-B, KKK
İlk Karşılaşmadan 2 gün sonra	KKK, TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG		
İlk Karşılaşmadan 2 Ay sonra <sup>3</sup>	DaBT-İPA-Hib (5 li Karma), ya da DaBT-İPA (4 lü Karma), Hep-B, OPA, KPA <sup>2</sup>	DaBT-İPA, OPA, Hep-B, KKK	Td, OPA, Hep-B, KKK
İlk Karşılaşmadan 8 Ay sonra	DaBT-İPA (4 lü Karma), Hep-B, OPA	DaBT-İPA, OPA, Hep-B	Td, Hep-B

TCT : Tüberkülin Cilt Testi

\* Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşuları ile devam edilecektir.

1. 59 ayın üzerindeki çocuklara DaBT - İPA şeklinde uygulanmalıdır. 15 - 59 ay arası çocuklarda tek doz Hib yeterlidir .

2. - Mayıs 2008 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır. 12 - 23 aylık çocuklara 8 hafta ara ile iki doz yapılmalıdır.  
24 aydan büyük çocuklarda tek doz yeterlidir.

3. - DaBT - İPA - Hib aşısının ilk dozunun 12 - 14 aylıkken uygulandığı çocuklara ikinci doz da DaBT - İPA - Hib Şeklinde uygulanmalıdır.

**NOT :** Hib' in 2. dozu sadece ilk doz 12 - 14 ay arasında yapıldıysa gereklidir. 15 - 59 ay arası çocuklarda tek doz Hib yeterlidir.

59 aylıktan büyüklerde Hib aşısı gerekli değildir.

**Hepatit A Aşısı,** Mart 2011 ve sonrasında doğan çocuklara en az 6 ay ara ile iki doz uygulanır.

**Suçiçeği Aşısı,** 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan çocuklara tek doz uygulanır.